

[ACCUEIL](#) > [DEPHY](#) > CONCEVOIR SON SYSTÈME > SYSTÈME BEE - SAINT-ESTÈPHE

Système BEE - Saint-Estèphe

Conduite de la vigne et du verger

Fertilité et vie des sols

Mesures prophylactiques

AD, analyse du risque, optimisation de la dose

Régulation biologique et biocontrôle

Stratégie de couverture du sol

Année de publication 2019 (mis à jour le 26 Mar 2024)

 PARTAGER

Carte d'identité du groupe



Structure de l'ingénieur réseau

Conventionnel

Nom de l'ingénieur réseau

BEE

Date d'entrée dans le réseau

Site Saint-Estèphe**-75% de l'IFT hors
biocontrôle**

Objectif de réduction visé

Présentation du système

Conception du système

Le système BEE recherche la synergie entre un ensemble de pratiques agro-écologiques et une protection phytosanitaire à base de produits de biocontrôle. En situation de pression sanitaire élevée, des produits phytopharmaceutiques à base de cuivre sont utilisés pour le mildiou.

Deux particularités sont propres au site bordelais:

- Une reformation des pieds a été mis en place avec une taille guyot double raisonnée pour éviter l'entassement de végétation.
- Une protection phytosanitaire spécifique à la cible à protéger. Il y a donc deux calendriers de traitements (l'un pour le feuillage et l'autre pour la récolte). Par cette méthode, une réduction de la quantité de cuivre appliquée semble possible par son application exclusive sur la zone fructifère.

Mots clés :

Vigne - Agroécologie - Biocontrôle - Réduction du cuivre - Œnologie - Qualité

Caractéristiques du système

Type de production	Cépage	Porte-greffe	Densité	Mode de conduite	Hauteur palissage	Année d'implantation
Vin rouge de garde	Merlot noir	101-14 MG	9100	Guyot double	110m	2009

Gestion de l'irrigation : Aucune irrigation

Gestion de la fertilisation : Utilisation des plantes de service

Gestion du sol : Entretien mécanique du sol et de la flore ; utilisation des plantes de service. Les graminées sont notamment employées pour décompacter la semelle de labour

Infrastructures agro-écologiques : Bandes enherbées sur le pourtour de la parcelle



Objectifs ▲

Agronomiques	<ul style="list-style-type: none"> • Rendement : Obtenir un rendement au moins identique à l'itinéraire référent • Qualité : Optimale sur un plan sanitaire et analytique
Environnementaux	<ul style="list-style-type: none"> • IFT : -75% de l'IFT des produits phytosanitaires hors biocontrôle
Maîtrise des bioagresseurs	<ul style="list-style-type: none"> • Maîtrise des adventices : Gestion de leur destruction en fonction des espèces, de la hauteur de développement et de sa concurrence envers la vigne • Maîtrise des maladies : Les symptômes sur le feuillage ne sont pas acceptés jusqu'à la nouaison. Au delà, ils ne doivent pas être trop élevés et devenir la cause principale d'une perte de feuilles impactant la qualité de la récolte • Maîtrise ravageurs : Présence acceptée dans la limite de leur nuisibilité (définie en lutte raisonnée)
Socio-économiques	<ul style="list-style-type: none"> • Sécurité et santé : Recherche de pratiques agricoles exposant moins le viticulteur et améliorant ces conditions de travail

L'itinéraire doit garantir une viabilité de l'exploitation par un niveau de rendement et de qualité à minima similaire à la référence tout en réduisant au moins de 75% les intrants phytosanitaires non biocontrôle.

Des adaptations du système de production existant à celui proposé par BEE peuvent nécessiter un temps de transition en fonction de l'importance de ces changements. La gestion de la vigueur et de l'aération du végétal résument les deux thématiques qui doivent être travaillées préventivement. L'utilisation de produits phytosanitaires complèmentent seulement ces mesures pour réguler aux mieux les bioagresseurs. La mise en place de ces dispositifs dépend donc de nombreux facteurs :

- Moyens disponibles (équipement, main d'œuvre).
- Intégration de l'ensemble des leviers disponibles dans l'organisation globale de l'exploitation qui dépend à la fois de contraintes internes (moyens disponibles) et externes (météorologie...).

Pour ces raisons, aucun objectif n'est fixé en terme de marge brute ou de temps de travail. Ils vont dépendre à la fois des pratiques mises en œuvre et de la reconnaissance par le consommateur de l'effort consenti par le producteur qui aura appliqué cette itinéraire moins impactant sur un plan environnemental et également sur la santé humaine.



Le mot de l'expérimentateur

* Texte à compléter

Stratégies mises en œuvre :

Gestion des adventices ▲

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s'agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

*(Schéma décisionnel à insérer)

*Tableau à compléter

Leviers	Principes d'action	Enseignements

Gestion des ravageurs ▲

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s'agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.

*(Schéma décisionnel à insérer)

*Tableau à compléter

Leviers	Principes d'action	Enseignements

Gestion des maladies ▲

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s'agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.

*(Schéma décisionnel à insérer)

*Tableau à compléter

Leviers	Principes d'action	Enseignements

Maitrise des bioagresseurs


	Black Rot Intensité sur grappes			Mildiou Intensité sur feuilles			Mildiou Intensité sur grappes			Oidium Intensité sur grappes			Botrytis Intensité sur grappes			Pluviométrie (mm) Saison végétative
2018	Nulle			Moy - Forte	5	11	Forte	30	80	Nulle			Nulle			187,3
2019	Nulle - Faible			Faible	1,9	2,8	Faible	0,08	0,02	Nulle			Nulle			287,6
2020	Nulle			Moyenne	1,5	2,7	Forte	11,5	30,5	Nulle			Nulle			369,2
2021	Forte	0,33	0,26	Moy - Forte	6,5	10,6	Faible	0,5	0,97	Nulle			Faible			385,3
	TNT	REF	BEE	TNT	REF	BEE	TNT	REF	BEE	TNT	REF	BEE	TNT	REF	BEE	

	Pas de notation
	Absence de symptôme
	Présence (faible)
	Intensité moyenne des symptômes
	Intensité forte des symptômes


Performances du système

Performance environnementale

IFT biocontrôle et Hors biocontrôle par système et par année



Répartition de l'IFT Total par système et par année



Performance agronomique

*A compléter (graphique + texte)

Performance ... (sous-titre à compléter)

*A compléter (graphique + texte)

Evaluation multicritère

*A compléter (graphique + texte)

Zoom sur... (titre à compléter) ▲

* A compléter

Transfert en exploitations agricoles ▲

* A compléter

Pistes d'amélioration, enseignements et perspectives

* Texte à compléter

Productions associées à ce système de culture

Galerie photos

Contact



Marc VERGNES

Pilote d'expérimentation - Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV)

✉ marc.vergnes@vignevin.com