

Présentation du système



## Conception du système

Afin de répondre à la demande politique de développement de l'agroécologie, la chambre d'agriculture du Vaucluse a sollicité l'INRAe, L'IFV et les chambres d'agriculture du Gard et de la Drôm des sols.

Mots clés:

Agroécologie - Co-conception - Biodiversité - Sol - Diversification

## Caractéristiques du système

Type de production	Cépage	Porte-greffe	Densité	
Raisin de cuve	Clairette, Vermentino, Muscat d'Alexandrie, Colombard	Ru140	3000 pieds/ha	

Gestion de l'irrigation et de la fertilisation : Fertirrigation enterrée à 80 cm de profondeur

Gestion du sol : Tonte de l'inter-rang, enherbement sous le rang avec des épervières piloselle implantées sur paillage biodégradable, toile tissée sous le thym

Infrastructures agro-'ecologiques: Haie diversifi'ee, enherbement diversifi'ee, å chauve-souris, perche à rapaces, abris à reptiles, nichoirs à passereaux et chouette chev'eche

## Objectifs 🛦

Agronomiques	Rendement : 80 hl/ha Qualité : Vin Sans Indication Géographique
Environnementaux	IFT : Au moins - 50 % de l'IFT total
Maîtrise des bioagresseurs	Maîtrise des adventices : Bonne maîtrise en minimisant le nombre de tontes     Maîtrise des maladies : Tolérance dans la limite des objectifs quantitatifs et qualitatifs     Maîtrise des ravageurs : Tolérance dans la limite des objectifs quantitatifs et qualitatifs
Socio-économiques	Marge Brute : Rémunération correcte de l'agriculteur     Temps de travail : Tâches équilibrées sur l'année

En étant diversifié, le système se veut résilient : une perte de rendement sur l'une des deux cultures peut être compensée par un gain sur l'autre culture.



Le mot de l'expérimentateur



Les partenaires du projet sont nombreux. En effet, la multiplication des collaborations avec des organismes et associations est l'un des objectifs majeurs du projet Diverviti afin de mutualiser les r des Oiseaux) afin de favoriser la biodiversité avicole dont notamment l'introduction d'une chouette chevêche sur le site, ou l'ADAPI (Association de Développement de l'Apiculture Provençale) da


- GCP (Groupe chiroptères de Provence) pour favoriser l'installation de pipistrelles de Kulh susceptibles de prédater les eudémis ;
- NETAFIM pour la mise en place de la fertirrigation enterrée profondément ;
- BEE FRIENDLY dans le but de mettre en place des pratiques respectueuses des abeilles ;
- Lycée agricole d'Orange et MFR de Bollène sur la thématique agro-écologie en général et plus spécifiquement l'implication par la fabrication de nichoirs à oiseaux et chiroptères ;
- Université d'Avignon pour les suivis de biodiversité de lombrics et d'arthropodes du sol.

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réus:

## Stratégies mises en œuvre :

#### Gestion des adventices

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma.



Leviers	Principes d'action	
Epervière piloselle sous le rang	<ul> <li>Couverture totale sous le cavaillon : espèces couvrantes empêchant le développement des espèces indésirables ; peu concurrentielles de la vigne.</li> <li>Propriétés allélopathiques : diffusion de composés chimiques par les racines inhibant la germination des espèces concurrentes.</li> </ul>	Mise en place : opératic Hétérogénéité de l'impl Gestion : pioche mais al
Enherbement de l'inter-rang	Couverture totale de l'inter-rang (enherbement semés)	
Travail du sol de l'inter-rang	Travail du sol de l'inter-rang à l'aide d'un griffon (1 rang sur 2 en 2021 et tous les rangs en 2022 et 2023)	
Eco-pâturage hivernal et tonte	Pâturage de l'enherbement par des moutons en lien avec un berger local (1 fois/an)  Tonte de l'inter-rang à l'aide d'un gyrobroyeur (2019-2021)	Vitipastoralisme : aucur
Installation de paillage sous le thym	Toile de paillage tissée	Quelques zones où la t

L'un des principaux objectifs du projet est la couverture permanente du sol afin de préserver, voire améliorer la qualité du sol (matière organique notamment) et la vie du sol, stocker du carbone et Cependant, une hétérogénéité de développement des ceps de vigne dans ce système a été observée depuis 2021. Ceci peut s'expliquer par un problème d'arrosage au printemps 2021, à un sol pl
Afin de compenser la concurrence hydrique générée par l'enherbement, nous avons fait le choix de :

- utiliser une porte-greffe vigoureux (Ru140) ;
- uitable de la fertirigation enterrée en profondeur afin \* d'alimenter \* directement les racines de la vigne plutôt que l'enherbement.
- réaliser un travail du sol de l'inter-rang : 1 rang / 2 en 2021 et tous les rangs en 2022 et 2023.

Gestion des ravageurs 🛕



Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma.




Leviers	Principes d'action	Enseignements			
Biocontrôles via la confusion sexuelle	Perturbation du système hormonal de reproduction des parasites (vers de la grappe)	Faible pression			
Favoriser les auxiliaires	<ul> <li>Haie diversifiée</li> <li>Abris : niches à chiroptères, perchoir à rapaces, tas de cailloux etc.</li> </ul>	Présence de chiroptère(s) sur la parcelle (enregistrements)			

À noter que nous sommes en lutte obligatoire Flavescence Dorée donnant lieu à 1 ou 2 traitement(s) insecticides.

#### Gestion des maladies 🛕

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma.



Leviers	Principes d'action
Biocontrôles	Utilisation de produits de biocontrôles dans la lutte biologique contre le mildiou et l'oïdium
Optimiser les doses de fongicides	Méthode Optidose® : un outil d'adaptation de la dose de produit phytosanitaire à la situation à traiter prenant en compte le stade phénologique, le développement pression parasitaire et la sensibilité parcellaire.
Taille minimale	Limitation de la sensibilité aux maladies cryptogamiques
Multi-cépages	Mélange de plusieurs cépages vinifera blancs afin de tirer profit de la résilience d'un système multi-cépage (différentes sensibilités aux maladie:
Ampelomyces quisqualis	Implantation de plantes relais afin d'héberger Ampelomyces quisqualis dans la lutte biologique contre l'oïdium

La diversification vigne-thym peut s'annoncer contraignante durant des années pluvieuses. Après une pluie, il faut attendre quelques jours de beau et chaud pour récolter. Par exemple, durant l'an fonction de l'enjeu économique des 2 productions.



## Maîtrise des bioagresseurs

Le niveau de présence des bioagresseurs dans le système est représenté par trois couleurs : vert (bonne maîtrise bioagresseurs), jaune (moyenne maîtrise), et orange (maîtrise insuffisante).

	Mildiou	Oïdium	
2020			
2021			
2022			
2023			

Oïdium: au cours des 4 dernières années, des pressions nulles à légères en oïdium ont été observées.

Mildiou : la vigne est sujette à la défoliation de fin saison causées par le mildiou mosaïque. De plus, une grave attaque sur grappes en 2023 a été observée, le thym ayant été récolté très tard et le

Black Rot: aucune pression de black rot n'a été observée durant les 4 années.

Vers de la grappe : faible pression.

Adventices : maîtrise des adventices satisfaisante pour les années 2020 et 2021. Durant l'année 2021, une importante hétérogénéité de développement des ceps a été observée, entrainant le che présence d'espèces indésirables, mais ne dépassant pas un seuil trop concurrentiel.

## Performances du système

#### Performance agronomique :

#### Rendement de la Vigne

	2020	2021	2022	2023
Rendement (hl/ha)*	/	/	2	30

\*Densité de plantation : 2 941 ceps/ha

La concurrence hydrique générée par une couverture végétale totale, un sol peu fertile, une attaque de mildiou forte en 2023 et un problème d'arrosage ont impacté fortement le développer particulier pour des IGP. L'itinéraire technique doit être maintenu pour diminuer la concurrence hydrique afin que les ceps s'implantent et se pérennisent au mieux.

#### Rendement du Thym:

	2020	2021	2022	2023	
Placette	2.13	8.29	8.82	16.64	
Parcelle	0.413	3.8	5.99	7.63	

## Rendement (kg d'huile essentielle/ha)

Placette = rendement en huile essentielle avec coupe minutieuse au sécateur et micro-distillation expérimentale.

Parcelle = rendement en huile essentielle avec coupe à la machine et distillation par un prestataire.

Les rendements sont satisfaisants, sachant qu'il est classique que le rendement en Huile Essentielle soit plus faible pour une culture plantée sur toile tissée, comparée à une culture en pleine t existe différents leviers qui définissent le rendement. Tout d'abord la date de récolte. En effet, celle-ci est positionnée préférentiellement lorsqu'il y a 3/4 de fleurs fanées. De plus, l'irrigation et la

## Performance oenologique et qualitative .

## Analyse sur vin (Blanc 2022)

Date	На	AT g/l H2SO4	Ac. Malique g/l	Alcool %vol	Sucre réd. g/l	SO2 libre mg/l	SO2 total mg/l	CO2 mg/l
08/11/2022	3.5	3.13	1.9	13.52	0	19	91	1 180

Concernant le blanc, il est dans les données standards d'un blanc (dire d'expert) et conforme aux restrictions du cahier des charges IGP et Côtes-du-Rhône. Concernant les sulfites libres (SO2 libre




#### Analyse sensorielle sur blanc 2022

12 panélistes du jury expert ont participé à la dégustation de ce vin le 16/05/2023. Après contrôle de leurs performances de discrimination et de consensus, 11 juges ont été retenus dans le traiter Le vin a été servi dans un verre noir, et la bouteille, recouverte d'un cachottier, était anonymisée avec un code à 3 chiffres. Les juges ignoraient l'objectif de la dégustation. Le vin a ainsi été dégus 19 paramètres ont été évalués grâce à une échelle de notation en 11 points allant de 0 à 10.




Une analyse sensorielle du vin blanc 2022 a été réalisée par un panel de jury experts. L'appréciation globale est légèrement inférieure à la moyenne. L'intention d'achat est forte (10 dégustateur. Rhône mais plutôt d'un IGP (6 non, 4 oui, 1 ne se prononce pas).

#### Performance environnementale



En partenariat avec la MFR du Haut Vaucluse, un suivi de la faune et la flore a été réalisé chaque année donnant lieu à des inventaires afin d'évaluer la biodiversité avant et après installation du s au sein et aux abords de la parcelle aussi bien en termes de quantité d'individus que de la diversité d'espèces. Cependant, ces résultats sont à nuancer. En effet, le projet reste encore jeune et les

# IFT Total de référence (hors herbicides et biocontrôles)\*:8.4 / IFT Biocontrôle de référence\*:19




Synthèse des IFT totaux (hors biocontrôles et lutte obligatoire Flavescence Dor



FD = Flavescence Dorée

Dans ce système, nous observons une baisse des IFT par rapport à la référence, facilitée par l'usage de biocontrôles.

## Evaluation multicritère



En fonction des critères, des seuils quantitatifs et/ou qualitatifs ont été établis, donnant lieu à des notes de 1 à 5 (1 étant considéré comme très défavorable et 5 très favorable).

Zoom sur l'établissement des ceps de vigne 🛕





Nous pouvons voir sur la photo ci-contre que le cep a tendance à ne pas être bien maintenu. Nous pouvons supposer que le fait d'avoir établi en mono-cordon a un manque de stabilité. L'idée première étant de limiter les plaies liées à la taille, la vigne a donc été montée au fil le plus vite possible.

De plus, les tuteurs en bambou sont très facilement sujets à la casse. Peut-être que des tuteurs plus résistants auraient pu permettre au cep d'être mieux maintenu. utiliser des fers à béton mais plus coûteux et plus difficile à mettre en place dans une situation de taille haute.

Enfin, il est nécessaire de choisir un fil porteur d'un diamètre assez épais afin de résister et maintenir au mieux le poids de la vigne.

Nous pouvons nous questionner concernant la pérennité de ce mode de conduite et de l'évolution du comportement de la vigne dans cette situation à venir.

## Transfert en exploitations agricoles

Dans cette expérimentation système, la diminution d'IFT se base principalement sur de la substitution de produits par des leviers de gestion alternatifs. Ainsi, ces pratiques sont plus ou moins facile

- La substitution de fongicides de synthèse par des biocontrôles est simple mais parfois peu économique.
- L'utilisation de la confusion sexuelle contre les vers de la grappe, simple à adopter.
- L'installation de piloselle sous le rang est longue et coûteux mais si l'implantation se fait bien, elle peut permettre de gagner du temps et par conséquent un gain économique.
- La tonte sur l'inter-rang est une opération rapide et facile à mettre en place

Le mode de conduite peut s'avérer coûteux. Le temps d'ébourgeonnage et d'attachage a été conséquent les premières années mais réduit d'année en année.

# Pistes d'amélioration, enseignements et perspectives

Ces travaux de recherche doivent être poursuivis afin de continuer à suivre l'évolution du comportement de la parcelle, si

- le rendement se maintient et si il y a des conséquences sur la durée de vie des ceps;
- le comportement des ceps évolue suite à la formation du pied et du cordon;
- la gestion des adventices par la piloselle sous le rang et tonte en inter-rang se poursuit ou si le salissement évolue ;
- la diversification avec le thym est viable à long terme ;
- la biodiversité se développe, suite à l'installation des aménagements.



# Productions associées à ce système de culture



Panneau DIVERVITI



Plaquette DIVERVITI

# Galerie photos



Ruches



<u>Piloselle en fleur sous le rang de vigne</u>



Thym en fleur dans l'inter-rang





Laura TABUTEAU

Pilote d'expérimentation - Chambre d'agriculture

✓ <u>laura.tabuteau@vaucluse.chambagri.fr</u>