



# Amblyseius-Breeding-System (ABS)



**Produit :** *Amblyseius cucumeris* (Acarien prédateur)

**Cible :** Le thrips du tabac *Thrips tabaci* et le thrips californien *Frankliniella occidentalis* en cultures ornementales et légumières (Concombre, poivron, aubergine, etc.)

**Dose :**

Amblyseius-Breeding-System	Dose	Fréquence et intervalle d'introduction
Préventif (cultures ornementales)	1 sachet/ 2m <sup>2</sup>	1 apport toutes les 5 à 6 semaines
Préventif (cultures légumières)	1 sachet/2 à 3 plantes	1 apport toutes les 5 à 6 semaines
Curatif léger	-	-
Curatif lourd	-	-

**Introduction**

- ✓ Suspendre le sachet au végétal toujours verticalement.

**Conditions**

- ✓ Introduction possible toute l'année si température > à 16°C et Humidité relative > à 65%

**Stockage**

- ✓ Stockage 24 à 48 h après réception
- ✓ Température de stockage 10°C

**Remarque**

- ✓ Introduction préventive fortement conseillée.
- ✓ En cas d'attaque importante et/ou de conditions difficiles, combiner les introductions avec la punaise prédatrice *Orius spp* et/ou l'acarien prédateur *Amblyseius degenerans* et/ou l'acarien prédateur (stade pupe du Thrips) *Hypoaspis miles*.

**Apparence**

**Adulte :** acarien de couleur beige translucide, taille 0.5mm de long en forme de poire, 4 paires de pattes.

**Larve :** 1<sup>er</sup> stade petit adulte avec 3 paires de pattes.

**Mode d'action**

*Amblyseius cucumeris* consomme le stade L1 du Thrips en piquant sa proie et en la vidant de son contenu. La femelle fécondée plusieurs fois pond ses œufs sur les poils à la base des nervures de la face supérieure des feuilles. Le développement (œuf à adulte) s'effectue en 8 et 11 jours à respectivement 25 et 21°C.

**Contrôle de succès**

- ✓ Baisse de la présence du thrips sur les panneaux de contrôle Bug-Scan® bleus.
- ✓ 2 à 3 semaines après le lâcher, on devrait trouver des prédateurs sur les plantes.