

# Salades : Lutte contre les pucerons



Puceron nasonovia (CA BZH)

## Favoriser les auxiliaires

Taille des haies après le 31 juillet.


Fauchage raisonné :

(Laisser 10 cm de hauteur, débroussailler les fossés à l'automne, limiter l'entretien au printemps.)

**Observation des cultures :** Comptages 20 plantes au stade 4-6 feuilles

Suivi de l'intensité des vols (Bacs d'eau)

Destruction rapide des déchets de culture



## Protection insecticide en végétation

En bio : **Naturalis** (Par temps humide)

En conventionnel : 1 ou 2 **Movento** selon pression.

**Protection phytosanitaire du plant :**  
Homologation?

Prolongation du **bâchage insectproof** jusqu'au stade 18F

Règle de décision

- **Diversifier l'environnement** pour favoriser les auxiliaires
- **Surveiller les vols** et l'apparition des pucerons ailés sur les jeunes stades

	Pression faible		Pression forte	
	Conventionnel	Bio	Conventionnel	Bio
Si auxiliaires actifs <b>1 intervention</b> à la fermeture des pommes		<b>Ne rien faire</b>	Effectuer une intervention <b>au binage et 15 jours avant récolte.</b>	<b>Prolonger le bâchage</b> jusqu'au stade 18F Si temps humide appliquer <b>1 ou plusieurs Naturalis.</b>