


Stratégie de gestion des maladies & ravageurs



Maladies & ravageurs cibles :
 Septoriose, rouille jaune, fusariose. JNO.

- Objectifs :**
- F1 F2 >70% vert fin mai.
 - Pas de dégâts de maladies avec max un fongicide 1/2 dose.
 - Pas de dégâts de virose
 - IFT Fongicide 0.5
 - IFT Insecticide : 0.5
 - Pas de traitement de semences
 - Pas de régulateur

Leviers

Principes d'action


Points de vigilance

Précédent	Privilégier : Lin, Sarrasin, légumineuses (pois, pois chiche, féverole, luzerne)	
Choix variétal	Note septoriose > 7, bon comportement rouille jaune et fusariose. Tolérance verse	
Traitement de semence	Sucre / Vinaigre	Renouveler régulièrement les semences de ferme. Être vigilant lors du triage sur la qualité des semences.
Insecticide puceron	Adapter la stratégie selon la date de semis / pression de l'année - Semis à partir du 25/10 - 1 passage maximum - Impasse pour les semis après le 10/11	Suivre la pression de l'année, vigilance En cas d'hivers doux.
Ajustement de la fertilisation	Fractionnement de la fertilisation azotée. Limiter les apports à tallage. Répondre aux besoins en soufre et phosphore	
Fongicide	Impasse montaison. Traitement unique à DFE. Rajouter 3.5 kg d'Epsotop.	Vigilance rouille jaune

IFT référence 2017 (70^{ème} percentile)

Herbi : 2.2
 Fongicide : 2.1
 Insecticide : 0.5
 Autres : 0.4

Stratégie de gestion des adventices



Leviers

Principes d'action

Points de vigilance

Déchaumages / faux semis

Passages superficiels & rappuyés, à partir de septembre, pour éliminer un maximum le stock de graines

Vigilance en cas d'automne humide pour la destruction

Date de semis

Privilégier les semis du 25 octobre au 1^{er} novembre

Choix variétal

Tolérance Chlorto

Herse étrille

Passage à l'aveugle puis à 2-3 F. Semer plus creux et rehausser densité de semis de 10%.

