été 01 dérobée exploitée D finalement

Du RGI-colza pâturé et fauché remplace le maïs dans la rotation, pour maintenir la surface accessible tout en limitant l'usage des phytosanitaires.

État de la parcelle implantée en RGI-colza en janvier 2022.

RGI-trèfle après céréales pour de l'ensilage d'herbe et 20 ha, semés moins denses, destinés au pâturage des génisses en Au Gaec de Pors nevez, à Lanil-dut (29), les dérobées ont leur place dans la rotation : 18 ha de

Sur les 30 ha accessibles, une interruption du pâturage sur 14 à 15 mois s'opère quand du mais est généralement implanté pour casser les prairies en mars. Lors d'un diagnostic préalable à l'engagement de l'exploitation dans le groupe Dephy Nord-Finistère, François Prigent et sa sœur Nadine ont évoqué la possibilité d'implanter une dérobée de RGI et colza, «pour favoriser le pâturage tout en cassant la possibilité d'implanter une des le pâturage tout en cassant la possibilité d'implanter une des le pâturage tout en cassant la possibilité d'implanter une des le pâturage tout en cassant la possibilité d'implanter une des le pâturage tout en cassant la possibilité d'implanter une des le pâturage tout en cassant la possibilité d'implanter une des le pâturage tout en cassant la possibilité d'implanter une des le pâturage tout en cassant la possibilité d'implanter une des le pâturage tout en cassant la possibilité d'implanter une des le pâturage tout en cassant la particular de la particular des la particular des la particular des la particular de la particular des la particular des la particular de l

2 ha d'essais en 2021

Après échanges, recherches d'information et visites, 2 ha de RGA/trèfle blanc sont détruits mécaniquement. Un mélange de 6 kg de colza et de 12 kg/ha de RGI non alternatif est semé à la mi-juin avec un semoir à céréales à disques puis un passage de rouleau. L'exploitation de cette dérobée a démarré en août, avec des pesées de biomasse avant le passage du troupeau. Fin juillet-début août, le rendement est estimé à plus de 3 t MS. « Cette parcelle a pu être pâturée avec un colza très dynamique, rationné durant 2 à 3 heures, alors que le RGA/TB commençait à fléchir sur nos terres séchantes. Si le premier jour, les vaches ont boudé le fourage, cela n'a pas duré bien longtemps », rapporte François Prigent. Les vaches avaient accès à deux paddocks de RGA/TB

mation de 4 kg MS/VI, il faut juste être prévoyant et penser à avancer le fil le soir, pour éviter le bain avec la rosée le matin!», ajoute sa sœur Nadine, associée au Gaec. Le colza était présent jusqu'au 3º pâturage, puis le RGI a pris le dessus. Le pâturage s'est poursuivi jusqu'à décembre. La ration n'a pas été modifiée.

12 T MS RÉCOLTÉS EN 18 MOIS





ser » les outils de désherbage mécanique, pour plus d'au-tonomie, Après l'herbe, « les

POURSUIVRE LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

membres du groupe de ne pas le casser, pour continuer à le pâturer l'hiver et l'enrubanner au printemps. Sur les 18 mois de mise en place, sans inter-vention de désherbage ni de fertilisation, j'en ai ainsi retiré 12 t MS/ha ». Cassée le 20 oc-« Les vaches ont bien répondu en lait et les taux se sont mainteront pas sur l'échec de cette année 2022 atypique. 3 ha de RGI-colza seront de nouveau semés en 2023. La sole de mais de la même surface: « Moins de mais dans la rotation, c'esi François Prigent. Carole David



la place au semis de RGA/TB (28 kg/ha), avec une bonne levée sans adventice. « On attend maintenant le prin-Plus autonome et économe

2 autres hectares ont été semés en RGI colza en 2022, après labour. Sans grand succès: il n'y a pas eu de levée. Après deux arrosages (20 mm), le colza a germé. 30 mm de pluie supplémentaires en août ont permis un seul passage de pâturage. « Le colza n'est pas reparti et on n'a jamais vu le RGI... Heureusement que ce n'était pas notre premier test! Mais sans regret, le mais n'aurait rien donné Toutes les années ne se res-semblent pas. Suite à cette pre-mière expérience concluante tout en maintenant le niveau de production. En parallèle d'un travail sur les cultures, il est aussi proposé aux 12 membres du groupe une entrée élevage chaque année (rotation, place de l'herbe...). Nous allons travailler sur les rotations des parcelles éloignées, pour éviter la monoculture de mais. Y intégrer de l'herbe, c'est possible. Une étude de cas concret sera faite chez un des agriculteurs. L'idée est de mettre prochainement chaque thème étudié en application chez un des membres: phy Nord-Finistère est d'être plus autonome (en au-tonomie de décision, en phyto-sanitaires, en autres intrants...), d'être plus économe (sur les cultures et dans l'ateller laitier).

Innover avec Dephy Ferme