



# OBSERVATIONS DES COUVERTS VÉGÉTAUX DU GERS

## CONTEXTE MÉTÉOROLOGIQUE



**Florent Blasco** - 6 ha - Argile limono-sableuse - **CULTURE SUIVANTE TOURNESOL**

**Choix des espèces** ➤ Vesce (40 kg/ha)

**Implantation** ➤ Semis au 14 oct, Semoir classique

**Destruction envisagée** ➤ Fin mars-début avril, Broyage + déchaumeur à disque

Metric	26-janv	16-Fev	08-mars
Couverture du sol (%)	15	20	33
Hauteur du couvert (cm)	5	10	10
Biomasse sèche (t/ha)			0,71

**Patrick Prunet Foch** - 12 ha - Limon argilo-sableux - **CULTURE SUIVANTE TOURNESOL**

**Choix des espèces** ➤ Vesce (35 kg/ha)

**Implantation** ➤ semis au 20 sept, semis au combiné

**Destruction envisagée** ➤ Début avril, Broyeur + déchaumeur à dent + herse rotative

Metric	26-janv	17-Fev	08-mars
Couverture du sol (%)	70	47,5	86,5
Hauteur du couvert (cm)	5	10	15
Biomasse sèche (t/ha)		0,6	0,9

**12 ha - Limon argilo-sableux** - **CULTURE SUIVANTE TOURNESOL**

**Choix des espèces** ➤ Vesce 35 (kg/ha)

**Implantation** ➤ semis au 15 oct, semis au combiné

**Destruction envisagée** ➤ Début avril, Broyeur + déchaumeur à dent + herse rotative

Metric	26-janv	17-Fev	08-mars
Couverture du sol (%)	50	37	76
Hauteur du couvert (cm)	5	10	12
Biomasse sèche (t/ha)		0,4	0,7

**Benoit Serin** - 5 ha - Boulbènes - **CULTURE SUIVANTE SOJA**

**Choix des espèces** ➤ Féveroles (80 kg/ha), Avoine noire (60/ha)

**Implantation** ➤ Semis au 15 oct, semis au combiné

**Destruction envisagée** ➤ 15 avril, Broyage + fraise rotative

Metric	1-fev	16-fev	6-mars
Couverture du sol (%)	61	70	72
Hauteur du couvert (cm)	20	25	25
Biomasse sèche (t/ha)		0,5	1,1, 1,3

**1,5 ha - Alluvions limono-argileuse** - **CULTURE SUIVANTE SOJA**

**Choix des espèces** ➤ Féveroles (80 kg/ha), Avoine noire (60 kg/ha), Radis fourrager (2 kg/ha), Phacélie (1 kg/ha)

**Implantation** ➤ semis au 7 oct, semis au combiné

**Destruction envisagée** ➤ 15 avril, Broyage + fraise rotative

Metric	1-fev	16-fev	6-mars
Couverture du sol (%)	98	98	100
Hauteur du couvert (cm)	20	30	30
Biomasse sèche (t/ha)		0,8	1,0, 2,2

**Emmanuel Negroni** - 17,45 ha - Argilo-sablo limoneux - **CULTURE SUIVANTE SORGHO ou TOURNESOL**

**Choix des espèces** ➤ Féverole (44), Pois fourrager d'hiver (10), Vesce commune (8), Trèfle incarnat (2,2), Tournesol Peredovick (2,9), Phacelie (2), Radis chinois (2,2), Cameline caroline (2,2), Navette finito (2,2), Moutarde blanche (2,3), Lin Lirina (2,2)

**Implantation** ➤ semis au 10 oct, semis direct

**Destruction** ➤ Mi-mai, Rouleau hacheur + déchaumeur à dent

Metric	1-Fev	08-mars
Couverture du sol (%)	10	15
Hauteur du couvert (cm)	5	10
Biomasse sèche (t/ha)		0,71

**Nicolas Estrade** - 5 ha - Argilo-limoneuse - **CULTURE SUIVANTE SOJA**

**Choix des espèces** ➤ Grand épeautre (200 kg/ha)

**Implantation** ➤ semis au 26 oct, semis à la volée

**Destruction** ➤ 6 Mars, Déchaumeur à ailette

Metric	25-Jan	17-Fev	6-Mars
Couverture du sol (%)	25	35	43
Hauteur du couvert (cm)	10	13	15
Biomasse sèche (t/ha)			0,74

**Jean-Jacques Garbay** - 6 ha - Boulbènes profondes - **CULTURE SUIVANTE TOURNESOL**

**Choix des espèces** ➤ Féveroles (40 kg/ha), Vesce (10 kg/ha), Navette (5 kg/ha), Phacélie (5 kg/ha)

**Implantation** ➤ semis au 15 oct, semis au combiné

**Destruction envisagée** ➤ 15 avril, Broyeur réalisé par l'agriculteur + déchaumeur à disque

Metric	1-fev	16-fev	6-mars
Couverture du sol (%)	88	95	95
Hauteur du couvert (cm)	15	20	20
Biomasse sèche (t/ha)		0,6	0,9, 2,0