



















Date Suivi		Autres remarques :
Stade		
Parcelle / variété		

Nombre de plants suivis (observer au moins 30 plantes dans l'abris concerné):

Nb de plants concernés

Nb de plants concernés

 0.5 mm	<p>Acaridens ravageurs</p>		<p>Cécidomyies (Feltiella acarisuga)</p>		<p>Oidium sur fruit</p> <p>sur feuille</p>
 1 à 6 mm	<p>Pucerons</p>	 >0.5 mm	<p>Staphylin (Oligota flavicornis)</p>		<p>Botrytis</p> <p>Sur fruit :</p> <p>Sur feuille :</p>
 <3 mm	<p>Thrips</p>	 1.5 mm WSU-TFREC	<p>Coccinelle (Stethorus punctillum)</p>		<p>Plants de fraisiers sans (gauche) et avec (droite) chlorose marginale</p>
 <3 mm	<p>Aleurodes</p>	 Larve de Chrysope (taille 1,3mm)	<p>Chrysope</p>		<p>(Parasitisme de pucerons)</p> <p>Praon</p> <p>A. colemani</p> <p>A. Ervi</p>
 10-13 mm	<p>Othiorynques</p>		<p>(Parasitisme de pucerons)</p> <p>Praon</p> <p>A. colemani</p> <p>A. Ervi</p>		<p>Othiorynques</p>
 4 - 6 mm	<p>Lygus</p>	 <2.5 mm	<p>Orius spp.</p>		<p>Lygus</p>
		<p>Autres auxiliaires / ravageurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - 			

Observations pour le BSV FRAISE

Nom PRODUCTEUR :

Date :

Maladies	Parcelle 1			Parcelle 2		
	% de parcelles touchées	% de plants touchés	intensité Faible (f) /moyenne (m)/ Forte (Fo)	% de parcelles touchées	% de plants touchés	intensité Faible (f) /moyenne (m)/ Forte (Fo)
Botrytis						
Oïdium						
Anthraxose						
Chlorose marginale						
Maladie des taches foliaires						
Phytophthora cactorum						
Phytophthora fragariae						
Rhizoctonia solani						
Rhizopus						
Verticilliose						
Virus						
Maladie des taches angulaires (Xantho.)						
Ravageurs	% de parcelles touchées	% de plants touchés	intensité Faible (f) /moyenne (m)/ Forte (Fo)	% de parcelles touchées	% de plants touchés	intensité Faible (f) /moyenne (m)/ Forte (Fo)
Thrips						
Pucerons						
Acariens						
Lygus / liocoris						
Aleurodes						
Drosophila suzukii						
Punaises nezara						
Noctuelles défoliatrices						
Tarsonème						
Nématodes						
Cicadelle						
Duponchelia fovealis en culture						
Harpale						
Limaces						
Anthonome						
Otiorhynque						
Taupin						
Vers blancs						
Vers gris ou noctuelles terricoles						
Autres, précisez :						
fourmis						
Remarques complémentaires sur la culture (type de plants, stress sur la culture etc.):						