

1 AVANT LE TRAITEMENT

ÉPAMPRAGE

Les larves sont très présentes sur les pampres

Pour optimiser le traitement :

- Épamprer au minimum 2-3 jours avant le traitement (temps pour les larves de remonter dans le feuillage)

- ou -

- Traiter sur tout le feuillage (pampres comprises)

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE

Avant d'ajouter les pyrèthres :

- pH de la solution acide (<6,8)
(optimum entre 6,0 et 6,5)

Appliquer seul de préférence

En cas de mélange avec d'autres produits :

1. Ajuster le pH de la solution avant introduction
2. Incorporer en dernier dans la bouillie.

CONDITIONS CLIMATIQUES OPTIMALES

S'assurer des conditions suivantes :

- **Hygrométrie minimale** : 75 %
- **Température de l'air** : entre 10°C et 25°C
- **Pluie à 2h max** : 1 mm
- **Vent max** : 19 km/h

NE PAS TRAITER

Trop tard le matin
et au pic de soleil

Les pyrèthres sont
sensibles aux UV
+ fort risque de
phytotoxicité

Spécificité 2024

Les pyrèthres ne sont pas autorisés lors
de la floraison de la vigne et aucune
dérogation possible pour 2024

→ Décaler votre traitement par
rapport à la floraison

POUR RAPPEL

- Dose unique : 1.5L/ha
- ZNT = 50m DAR = 3j DRE = 6h
- Nombre max d'applications/an : 3
- Nombre et dates de traitements déterminés par le SRAL/FREDON en fonction des analyses de risques
- Mention SPE 8 = dangereux pour les abeilles. Ne pas appliquer pendant la floraison de la vigne

COMPOSITION

Pyrèthres naturel (18,6 g/L)
à base d'extrait de fleurs
(Chrysanthemum cinerariaefolium)

NOMS COMMERCIAUX

PYREVERT, PYR IP, KRYNANTHIA,
FITOPYR, CICAPYR, PYRETRETIO



Idéalement
traiter 2 heures avant
le coucher du soleil
et/ou 3 heures après

2 PENDANT LE TRAITEMENT



CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer dans l'heure
(durée de demie-vie* = 90 min)

Volume hectare
Favoriser un bon mouillage de la
végétation : volume > 150 L/ha

Taille de goutte
Éviter les grosses gouttes (<500 µm)

Adjuvants
Si hygrométrie trop basse (< 60%),
ajouter un mouillant (Heliosol, ...)

* Temps après lequel l'efficacité du produit est réduite à 50%

- Limiter la distance entre l'extrémité des buses et la cible de 40 ou 50 cm, sinon il y a plaquage des feuilles
- Orienter les buses de 5° à 10° vers l'avant, et les buses du bas vers le haut de 15 à 30°
- Si possible face par face
- En jet porté ou projeté : réduire si possible les distances entre les buses et les feuilles
- Éviter les recoupements entre les jets
- Assurer une bonne ventilation et viser les larves sur la face inférieure des feuilles
- Ajuster à la taille de la végétation, viser les pampres si la parcelle n'est pas épamprée
- Éviter si possible les traitements à l'aide de canons oscillants




Figure 1 : Orientation de 5 à 10° vers l'avant
(FDCUMA Ouest, CA49)

3 APRES LE TRAITEMENT

1. Bien nettoyer son matériel des débris végétaux : soufflette, karsher, ...
2. Vérifier l'efficacité de son traitement : effectuer un comptage larvaire (voir fiche 3/3)

CONDITIONS DE CONSERVATION

Bidon à conserver d'une année sur l'autre :

- À l'abri de la lumière
- À une température inférieure à 25°C
- Non entamé : ne pas utiliser un bidon ouvert depuis plus de 6 mois



Garder le timing des 8 jours
entre chaque traitement



Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche avec l'appui technique et financier de l'Office français de la biodiversité