

RÉSEAU DEPHY

Grandes cultures Polyculture – élevage

RÉDUIRE LA PRESSION DES GRAMINÉES HIVERNALES : INTRODUCTION DE NOUVELLES CULTURES ET DU DÉSHERBAGE MÉCANIQUE













SOLS PRINCIPALEMENT LIMONEUX

QUELQUES SECTEURS AVEC SILEX


TRAJECTOIRE DU CHANGEMENT

EVOLUTION DE L'ASSOLEMENT





DIMINUTION DE L'IFT HERBICIDE



FOCUS SUR LA RÉCOLTE 2023

OECKIT TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PR

PRINCIPAUX LEVIERS MIS EN PLACE CONTRE L'ENHERBEMENT

- ✓ Mise en place de faux-semis
- ✓ Passage de la herse étrille à l'automne sur les céréales
- ✓ Intervention de la bineuse à l'automne sur les colzas pour gérer l'enherbement inter-rang et les potentielles repousses de colza
- ✓ Utilisation de la herse étrille au printemps sur le lin, l'introduction de cette culture permet une rupture dans la rotation et permet un nettoyage des parcelles.



L'AGRICULTEUR EST SATISFAIT
DE LA GESTION DE L'ENHERBEMENT SUR CETTE CAMPAGNE



Document réalisé par : LEA SGRO Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – IR l.sgro@eure-et-loir.chambagri.fr







Réseau DEPHY FERME

FILIÈRE GRANDES CULTURES & POLYCULTURE -ÉLEVAGE





Comment réduire la pression des graminées hivernales en limitant l'utilisation des produits phytosanitaire par l'introduction de nouvelle culture et du désherbage mécanique.

Exploitation de 93ha en conventionnel et non irriguée dans le perche eurélien, sols principalement limoneux quelques secteurs avec silex.



Trajectoire du changement

Tests



2012 — 2016: **Tests**d'itinéraires
techniques en
agriculture intégrée
sur 1 parcelle avec
accompagnement
du conseiller

Multiplication des faux semis, alternance du labour, labour anticipé sur orge d'hiver

Visites d'exploitations

2020 : Achat d'une herse étrille : utilisation sur blé, pois et orges

Démonstrations

2009 : installation et adhésion au groupe de développement de Thiron-La-Loupe


2016 : intégration du **réseau Dephy**Grandes Cultures
Eure-et-Loir

Echanges de pratiques

2018 : Introduction de 2 nouvelles cultures dans la rotation : orge de printemps et pois chiche

Retours d'expériences


Evolution de l'assolement



Evolution de l'IFT herbicide

-30%

Evolution IFT herbicides depuis 2017 sur l'exploitation de Jérôme Garnier



Focus récolte 2023

Principaux leviers mis en place contre l'enherbement :

- Mise en place de faux-semis
- Passage de la herse étrille à l'automne sur les céréales
- Passage de la bineuse à l'automne sur les colzas pour gérer l'enherbement inter-rang et ls potentielles repousses de colza
- Passage de la herse étrille au printemps sur le lin, l'introduction de cette culture permet une rupture dans la rotation et permet un nettoyage des parcelles.

L'agriculteur est satisfait de la gestion de l'enherbement sur cette campagne



l.sgro@eure-etloir.chambagri.fr







