

VITICULTURE



Indice de Fréquence de Traitement du groupe DEPHY viticole TARNAIS 2010-2025





FICHE D'IDENTITÉ DU GROUPE ET CONTEXTE DU VIGNOBLE

Ces chiffres sont issus des bilans individuels réalisés chaque année depuis 2011. Ils concernent les 12 vignerons du groupe, dont 4 sont en viticulture biologique. La surface totale en vigne de ces 12 exploitations s'élève à **547 hectares, soit environ 11 %** du vignoble gaillacois. Les vignes sont implantées avec un écartement majoritairement de 2,20 mètres entre les rangs et de 1 mètre entre cep.

La pression maladies et ravageurs du vignoble Gaillacois :

- une pression mildiou relativement forte mais très fluctuante en fonction de la climatologie,
- la pression black-rot et oïdium reste moyenne (ponctuellement forte),
- l'ensemble du vignoble est sur une zone à 2 traitements obligatoires contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée (IFT minimum insecticide = 2),
- pour l'eudémis nous sommes ponctuellement soumis à de très fortes pressions que les vignerons régulent de plus en plus avec la confusion sexuelle (>50% du vignoble),
- la pression cicadelle verte est moyenne (ponctuellement forte).






En chiffres

69%

de l'IFT sont des
fongicides


13,6

IFT moyen du groupe
depuis 2010






Des vignerons qui raisonnent leurs traitements entrainant une fluctuation de l'IFT en fonction de la climatologie



**UN IFT QUI PEUT
ETRE DIVISE PAR 2
en fonction de la
pression mildiou
2011 et 2024**




Le mildiou reste la maladie majeure





Variabilité de l'IFT mildiou multiple de 3




CETTE VARIABILITÉ
MONTRE UNE
ADAPTATION À LA
PRESSION MILDIOU

CHIFFRES REPERE
Moyenne du
nombre de
passages en bio 10
et en conv 7




IFT oïdium depuis 2010






Evolution IFT oïdium



Cette variabilité montre une adaptation à la pression oïdium (cépages, parcelles) mais globalement elle suit les traitements mildiou sur le groupe (**fois 2,5 entre 2022 et 2024**).




IFT insecticides depuis 2010





Evolution IFT insecticides

IFT INSECTICIDE AVEC BIOCONTROLE




**TRAITEMENT
OBLIGATOIRE CONTRE
LA FLAVESCENCE DORÉE
STABLE.**

**LA PRESSION EUDÉMIS
AUGMENTE, CE QUI A UN
IMPACT SUR L'IFT AVEC
UN FORT
DÉVELOPPEMENT DE LA
CONFUSION SEXUELLE**

**CHIFFRES REPÈRE
3 insecticides en
comptant la
confusion sexuelle**



IFT herbicide à la baisse MAIS difficulté de maîtrise



IFT À LA BAISSÉ, AVEC
DE PLUS EN PLUS
D'ALTERNANCE DE
DÉSHERBAGE
CHIMIQUE ET
MÉCANIQUE
(7 VIGNERONS SUR 12
PRATIQUENT DU
DÉSHERBAGE
MÉCANIQUE)



Contact

Thierry MASSOL
Animateur réseau DEPHY

☎ 06 69 08 07 81

✉ t.massol@tarn.chambagri.fr

Retrouvez les résultats du groupe [ici](#) et la chaîne YouTube [ici](#)



Merci de votre attention !

